PROVA NON ESTRATTA 10/04/2025

PROVA SCRITTA 1

1) **Secondo i "10 passi UNICEF-OMS per l'allattamento al seno" è necessaria la definizione di:**
   a. Un protocollo scritto e condiviso
   b. Solo un'informazione al personale
   c. Solo un'informazione verbale
   d. Nessuna delle precedenti
2) **Nelle madri in cui si manifesta una lesione attiva da Herpes Simplex su capezzolo o areola:**
   a. È meglio sopprimere la lattazione e passare ad alimentazione con formula
   b. I neonati vanno isolati dalla madre
   c. L'allattamento è controindicato dal seno affetto, ma non dal seno non affetto (se presente)
   d. Non ci sono controindicazioni
3) **Quali dei seguenti farmaci possono essere indicati per il trattamento della sintomatologia dolorosa dovuta all'ingorgo mammario?**
   a. Corticosteroide
   b. Ibuprofene e /o paracetamolo
   c. Tramadolo
   d. Tutte le precedenti
4) **Indicare tra le seguenti l'opzione che differenzia l'ingorgo mammario dalla montata lattea:**
   a. Nella montata lattea vi è sempre ipertermia
   b. Nell'ingorgo mammario non c'è ipertermia
   c. Nessuna delle precedenti
   d. Nell'ingorgo mammario non fuoriesce o vi è una difficoltosa eiezione lattea dal capezzolo
5) **La responsabilità penale è:**
   a. Sempre del Direttore
   b. Di tutta l'équipe assistenziale
   c. Del Coordinatore
   d. Strettamente personale ed individuale
6) **Quale delle seguenti leggi istituisce gli ordini professionali?**
   a. Legge n.3 dell'11/1/2018
   b. Legge n.24 dell'8/3/2017
   c. D.M. 740 del 14/9/1994
   d. Legge n.42 del 26/2/1999

7) **Chi è responsabile della effettiva giacenza reale e contabile delle sostanze stupefacenti e psicotrope all'interno della Unità Operativa?**

   a. Responsabile dell'assistenza infermieristica
   b. Direttore responsabile del servizio farmaceutico
   c. Il Direttore Generale
   d. Il Dirigente medico della Unità Operativa

8) **La gonadotropina corionica (HCG) raggiunge il massimo delle concentrazioni plasmatiche nella donna in gravidanza:**

   a. Intorno alla 25ª settimana
   b. Tra l'8ª e la 12ª settimana
   c. Tra la 20ª e la 30ª settimana
   d. Oltre la 30ª settimana

9) **Qual è l'ormone che riduce l'attività della muscolatura liscia dell'utero durante la gravidanza?**

   a. Progesterone
   b. Estrogeni
   c. Testosterone
   d. Beta HCG

10) **L' endometriosi non è associata a:**

   a. Dismenorrea
   b. Dolore lombare
   c. Dolore pelvico cronico
   d. Dischezia

11) **Il gas utilizzato in laparoscopia per indurre il pneumo-peritoneo è:**

   a. O_2
   b. CO_2
   c. CO
   d. N_2O

12) **Il PAP TEST non può essere effettuato in caso di:**

   a. Presenza di flusso mestruale
   b. Menopausa
   c. Gravidanza
   d. Donna di età inferiore a 25 anni

13) **Nello "STRESS TEST" uroginecologico, si invita la paziente a:**

a. Tossire
b. Contrarre i muscoli addominali
c. Contrarre l'elevatore dell'ano
d. Starnutire

14) **Cosa si indica col termine "annessi fetali":**

a. Le membrane amniocoriali, il liquido amniotico, il funicolo e la placenta
b. I gameti, lo zigote, la blastocisti e la morula
c. Il periodo prodromico, dilatante, espulsivo e del secondamento
d. Il feto, la placenta, il bacino osseo e il canale complementare del parto

15) **Quale reperto anomalo si riscontra più frequentemente nell'esame delle urine di una gravida con preeclampsia?**

a. Proteinuria
b. Glicosuria
c. Chetonuria
d. Nessuna delle precedenti

16) **Quale tra le seguenti non è una indicazione al taglio cesareo in emergenza/urgenza:**

a. Bradicardia fetale persistente
b. Prolasso di funicolo
c. Taglio cesareo reiterato
d. Distacco intempestivo di placenta

17) **Nullipara, gravidanza singola, presentazione cefalica, >= 37 settimane di gestazione, in travaglio spontaneo. Questa descrizione a quale classe di Robson corrisponde?**

a. I
b. II
c. IV
d. IX

18) **In caso di malposizionamento fetale in travaglio, quali pratiche assistenziali l'ostetrica mette in atto?**

a. Un intervento con il rebozo
b. Non sono necessari interventi particolari
c. La somministrazione di ossitocina
d. Invitare la donna ad assecondare le spinte

19) **In caso di posizione fetale in sacrale, quale delle seguenti posizioni materne è sconsigliata?**

a. Sul fianco
b. Rotazione interna dei femori
c. Litotomica
d. Carponi

20) **Quando si classifica un tracciato cardiotocografico, devono essere valutati i seguenti parametri:**

a. Linea di base, variabilità
b. Reattività, eventuali decelerazioni
c. Accelerazioni
d. Tutte le risposte sono corrette

21) **Quando la frequenza cardiaca fetale espressa in battiti per minuto (BPM) si definisce tachicardica grave?**

a. Quando è maggiore di 200
b. Quando è maggiore di 170
c. Quando è minore di 200
d. Quando è superiore a 140

22) **L'uso dell'ecografia transvaginale è stato introdotto per valutare una variabile non considerata dal test di Bishop. Quale?**

a. Livello della parte presentata
b. Stato dell'orifizio uterino interno
c. Stato dell'orifizio uterino esterno
d. Posizione della cervice

23) **Secondo l'OMS, la fase attiva del primo stadio di travaglio generalmente non supera, per le pluripare, le:**

a. 8 ore
b. 6 ore
c. 12 ore
d. 10 ore

24) **Quale, tra le sottoelencate, non rientra nelle condizioni permittenti l'applicazione di una ventosa ostetrica?**

a. Sproporzione feto-pelvica
b. Donna in decubito supino e in posizione ginecologica
c. Normo conformazione del bacino materno
d. Membrane rotte

25) **Quale dei seguenti range di perdite ematiche configura una emorragia post partum massiva?**

a. Tra 550 ml e 1000 ml
b. Oltre i 1500 ml di perdita ematica persistente
c. Tra 1000 ml e 1500 ml
d. Meno di 500 ml

26) **Nelle lacerazioni perineali di II grado quali tessuti sono coinvolti?**

a. Solo cute vaginale
b. Mucosa vaginale e muscoli perineali
c. Mucosa rettale
d. Mucosa vaginale, muscoli perineali, sfintere dell'ano

27) **Con la II manovra di Leopold è possibile stabilire:**

a. La situazione fetale
b. L'epoca di gravidanza
c. I gradi di discesa della parte presentata
d. La lunghezza sinfisi fondo

28) **Solitamente l'ittero fisiologico rientra entro:**

a. 3 giorni
b. 7-10 giorni
c. 48 ore
d. 15 giorni

29) **Il prolasso di funicolo si configura a:**

a. Membrane rotte
b. Dilatazione completa
c. Membrane integre
d. Nessuna delle precedenti

30) **La donna in gravidanza deve essere sensibilizzata a prestare particolare attenzione a quale indicatore di benessere fetale?**

a. Movimenti attivi fetali
b. Battito cardiaco fetale
c. Algie pelviche
d. Aumento ponderale

PROVA ESTRATTA 10/04/2025

PROVA SCRITTA 2

1) **Secondo il decalogo UNICEF – OMS per l'allattamento al seno, la preparazione del personale deve rivolgersi:**
   a. Solo alle ostetriche e ai ginecologi
   b. A tutto il personale
   c. A tutto il personale tranne il personale OSS
   d. Solo alle ostetriche
2) **Madri affette da infezioni dell'epatite C (con anticorpi o RNA positivo):**
   a. L'allattamento è controindicato, ma solo al seno
   b. Possono allattare
   c. Non possono allattare
   d. Nessuna delle precedenti
3) **Indicare i segni di un attacco corretto al seno:**
   a. Bocca chiusa, mucosa delle labbra ben visibile, guance rotonde
   b. Presenza di "schiocchi", deglutizione udibile
   c. Bocca spalancata, mucosa delle labbra visibile, attacco asimmetrico (risulta visibile parte superiore dell'areola)
   d. Tutti i segni sono corretti
4) **Quale dei seguenti farmaci è indicato per il trattamento di prima scelta della mastite:**
   a. Amoxicillina
   b. Amoxicillina/acido clavulanico
   c. Metronidazolo
   d. Cabergolina
5) **Quale violazione commette l'operatore sanitario che, nell'esercizio delle sue funzioni, altera una cartella clinica?**
   a. Falso di referto
   b. Falso d'ufficio
   c. Falso materiale
   d. Non commette violazione
6) **Il profilo professionale, come definito dal DM 740/1994, prevede che l'ostetrica/o possa agire:**
   a. Solo in autonomia assoluta
   b. Solo in autonomia relativa
   c. Solo subordinata al medico ginecologo
   d. In autonomia relativa o assoluta a seconda del campo di azione

7) **Nella compilazione di una richiesta trasfusionale, oltre a cognome e nome, sono dati obbligatori per l'identificazione del paziente da trasfondere:**

   a. L'indicazione di precedenti trasfusioni
   b. La residenza con relativo indirizzo e numero civico
   c. La data di nascita
   d. Il numero di tessera sanitaria

8) **Qual è il periodo di gravidanza in cui si esegue l'amniocentesi?**

   a. Dalla 8ª alla 10ª settimana gestazionale
   b. Dalla 10ª alla 12ª settimana gestazionale
   c. Dalla 12ª alla 14ª settimana gestazionale
   d. Dalla 14ª alla 17ª settimana gestazionale

9) **Qual è l'ormone che contraddistingue la gravidanza fin dal suo insorgere?**

   a. Progesterone
   b. Testosterone
   c. Beta HCG
   d. Prolattina

10) **In caso di endometriosi può risultare aumentato:**

   a. CA125
   b. Colesterolo
   c. HCG
   d. FSH

11) **Uno dei vantaggi della laparoscopia è:**

   a. L'incremento delle aderenze viscero viscerali
   b. L'incremento delle aderenze viscero parietali
   c. La riduzione delle aderenze post operatorie
   d. Nessuna delle precedenti

12) **Il Papilloma Virus (HPV) non è causa di parte dei carcinomi:**

   a. Della vulva
   b. Delle ossa
   c. Della vagina
   d. Anorettali

13) **Per incontinenza urinaria si intende un fenomeno che riguarda:**

a. Perdita involontaria di urina
b. Perdita di urina involontaria oggettivamente dimostrabile
c. Un importante problema sociale
d. Tutte le precedenti

14) **Quale anomalia del funicolo è legata ad un attorcigliamento dell'annesso fetale su sé stesso**

a. Un giro a bandoliera
b. Due giri intorno al collo del feto
c. Un nodo vero
d. L'arteria ombelicale singola

15) **L'urinocoltura in gravidanza è richiesta per accertare la presenza nelle urine di:**

a. Albumina
b. Virus
c. Batteri
d. Emazie

16) **Quale di queste presentazioni rappresenta un'indicazione assoluta al TC?**

a. Fronte
b. Faccia
c. Bregma
d. Nessuna delle precedenti

17) **Nullipara, gravidanza singola, presentazione cefalica, >= 37 settimane di gestazione, travaglio indotto o sottoposta a taglio cesareo in assenza di travaglio. Questa descrizione a quale classe di Robson corrisponde?**

a. IV
b. II
c. VI
d. IX

18) **Quali benefici può apportare l'applicazione di impacchi caldo umidi sul perineo durante la fase espulsiva del travaglio?**

a. Rilassamento muscolare
b. Ossigenazione tissutale
c. Distensione della zona
d. Tutte le precedenti

19) **Quale fra le seguenti non è una posizione che permette l'apertura della parte superiore del bacino?**

a. In piedi
b. Dorso incurvato in avanti
c. Carponi
d. Fianco

20) **Per poter interpretare correttamente una registrazione cardiotocografica è indicata una durata minima di:**

a. 10 minuti
b. 20 minuti
c. 40 minuti
d. 60 minuti

21) **Cosa si intende per variabilità del tracciato cardiotocografico?**

a. Numero di battiti in un minuto
b. Indice di sofferenza fetale
c. Espressione delle continue oscillazioni della frequenza cardiaca fetale
d. Nessuna delle precedenti

22) **Quale di questi parametri non è considerato nello score di Bishop?**

a. Dilatazione della cervice
b. Presentazione fetale
c. Lunghezza della cervice
d. Posizione della cervice

23) **Secondo l'OMS, la fase attiva del primo stadio di travaglio generalmente non supera, per le nullipare, le:**

a. 12 ore
b. 10 ore
c. 8 ore
d. 6 ore

24) **Quale, tra le sottoelencate, non rientra nelle indicazioni per l'applicazione di una ventosa ostetrica?**

a. Inerzia-ipocinesia uterina
b. Macrosomia fetale
c. Risparmio di sforzo espulsivo
d. Arresto della progressione della parte presentata cefalica impegnata

25) **Quale dei seguenti range di perdite ematiche configura una emorragia post partum maggiore?**

a. Tra 1500 ml e 2000 ml
b. Meno di 500 ml
c. Tra 1000 ml e 1500 ml
d. Tra 500 ml e 1000 ml

26) **L'amnioressi deve essere praticata:**

a. Con dilatazione di almeno 7 cm
b. Sempre con dilatazione di almeno 4 cm
c. Secondo il caso clinico specifico
d. A dilatazione completa

27) **La IV manovra di Leopold permette di stabilire:**

a. La situazione fetale
b. L'atteggiamento fetale
c. Se la parte presentata è impegnata
d. Nessuna delle precedenti

28) **In un neonato con distress respiratorio si osserva:**

a. Acidosi metabolica
b. Vomito e irregolarità dell'alvo
c. Aumento della frequenza respiratoria e rientramenti toracici
d. Clonie

29) **La procidenza di funicolo si configura a:**

a. Membrane rotte
b. Dilatazione completa
c. Membrane integre
d. Nessuna delle precedenti

30) **Da quando è possibile che la donna apprezzi i primi movimenti fetali?**

a. 10-15 settimane
b. 18-22 settimane
c. 24-28 settimane
d. 32-36 settimane

PROVA NON ESTRATTA 10/04/2025 Gustavo Lauro

PROVA SCRITTA 3

1) **Secondo il decalogo UNICEF – OMS per l'allattamento al seno, la preparazione del personale deve rivolgersi:**
   a. Solo alle ostetriche e ai ginecologi
   b. A tutto il personale
   c. A tutto il personale tranne il personale OSS
   d. Solo alle ostetriche

2) **Quali dei seguenti farmaci possono essere indicati per il trattamento della sintomatologia dolorosa dovuta all'ingorgo mammario?**
   a. Corticosteroide
   b. Ibuprofene e /o paracetamolo
   c. Tramadolo
   d. Tutte le precedenti

3) **Indicare i segni di un attacco corretto al seno:**
   a. Bocca chiusa, mucosa delle labbra ben visibile, guance rotonde
   b. Presenza di "schiocchi", deglutizione udibile
   c. Bocca spalancata, mucosa delle labbra visibile, attacco asimmetrico (risulta visibile parte superiore dell'areola)
   d. Tutti i segni sono corretti

4) **Nelle madri in cui si manifesta una lesione attiva da Herpes Simplex su capezzolo o areola:**
   a. È meglio sopprimere la lattazione e passare ad alimentazione con formula
   b. I neonati vanno isolati dalla madre
   c. L'allattamento è controindicato dal seno affetto, ma non dal seno non affetto (se presente)
   d. Non ci sono controindicazioni

5) **La responsabilità penale è:**
   a. Sempre del Direttore
   b. Di tutta l'équipe assistenziale
   c. Del Coordinatore
   d. Strettamente personale ed individuale

6) **Quale violazione commette l'operatore sanitario che, nell'esercizio delle sue funzioni, altera una cartella clinica?**
   a. Falso di referto
   b. Falso d'ufficio
   c. Falso materiale
   d. Non commette violazione

7) **In caso di endometriosi può risultare aumentato:**

   a. CA125
   b. Colesterolo
   c. HCG
   d. FSH

8) **La gonadotropina corionica (HCG) raggiunge il massimo delle concentrazioni plasmatiche nella donna in gravidanza:**

   a. Intorno alla 25ª settimana
   b. Tra l'8ª e la 12ª settimana
   c. Tra la 20ª e la 30ª settimana
   d. Oltre la 30ª settimana

9) **Nullipara, gravidanza singola, presentazione cefalica, >= 37 settimane di gestazione, travaglio indotto o sottoposta a taglio cesareo in assenza di travaglio. Questa descrizione a quale classe di Robson corrisponde?**

   a. IV
   b. II
   c. VI
   d. IX

10) **L' endometriosi non è associata a:**

   a. Dismenorrea
   b. Dolore lombare
   c. Dolore pelvico cronico
   d. Dischezia

11) **Il Papilloma Virus (HPV) non è causa di parte dei carcinomi:**

   a. Della vulva
   b. Delle ossa
   c. Della vagina
   d. Anorettali

12) **Quale reperto anomalo si riscontra più frequentemente nell'esame delle urine di una gravida con preeclampsia?**

   a. Proteinuria
   b. Glicosuria
   c. Chetonuria
   d. Nessuna delle precedenti

13) **Quali benefici può apportare l'applicazione di impacchi caldo umidi sul perineo durante la fase espulsiva del travaglio?**

a. Rilassamento muscolare
b. Ossigenazione tissutale
c. Distensione della zona
d. Tutte le precedenti

14) **Quale di questi parametri non è considerato nello score di Bishop?**

a. Dilatazione della cervice
b. Presentazione fetale
c. Lunghezza della cervice
d. Posizione della cervice

15) **In caso di posizione fetale in sacrale, quale delle seguenti posizioni materne è sconsigliata?**

a. Sul fianco
b. Rotazione interna dei femori
c. Litotomica
d. Carponi

16) **Quando la frequenza cardiaca fetale espressa in battiti per minuto (BPM) si definisce tachicardica grave?**

a. Quando è maggiore di 200
b. Quando è maggiore di 170
c. Quando è minore di 200
d. Quando è superiore a 140

17) **Quale, tra le sottoelencate, non rientra nelle condizioni permittenti l'applicazione di una ventosa ostetrica**

a. Sproporzione feto-pelvica
b. Donna in decubito supino e in posizione ginecologica
c. Normo conformazione del bacino materno
d. Membrane rotte

18) **Quale dei seguenti range di perdite ematiche configura una emorragia post partum maggiore?**

a. Tra 1500 ml e 2000 ml
b. Meno di 500 ml
c. Tra 1000 ml e 1500 ml
d. Tra 500 ml e 1000 ml

19) **In caso di malposizionamento fetale in travaglio, quali pratiche assistenziali l'ostetrica mette in atto?**

a. Un intervento con il rebozo
b. Non sono necessari interventi particolari
c. La somministrazione di ossitocina
d. Invitare la donna ad assecondare le spinte

20) **La IV manovra di Leopold permette di stabilire:**

a. La situazione fetale
b. L'atteggiamento fetale
c. Se la parte presentata è impegnata
d. Nessuna delle precedenti

21) **Nello "STRESS TEST" uroginecologico, si invita la paziente a:**

a. Tossire
b. Contrarre i muscoli addominali
c. Contrarre l'elevatore dell'ano
d. Starnutire

22) **Quale tra le seguenti non è una indicazione al taglio cesareo in emergenza/urgenza:**

a. Bradicardia fetale persistente
b. Prolasso di funicolo
c. Taglio cesareo reiterato
d. Distacco intempestivo di placenta

23) **Quale anomalia del funicolo è legata ad un attorcigliamento dell'annesso fetale su sé stesso**

a. Un giro a bandoliera
b. Due giri intorno al collo del feto
c. Un nodo vero
d. L'arteria ombelicale singola

24) **In un neonato con distress respiratorio si osserva:**

a. Acidosi metabolica
b. Vomito e irregolarità dell'alvo
c. Aumento della frequenza respiratoria e rientramenti toracici
d. Clonie

25) **Nelle lacerazioni perineali di II grado quali tessuti sono coinvolti?**

a. Solo cute vaginale
b. Mucosa vaginale e muscoli perineali
c. Mucosa rettale
d. Mucosa vaginale, muscoli perineali, sfintere dell'ano

26) **Il prolasso di funicolo si configura a:**

a. Membrane rotte
b. Dilatazione completa
c. Membrane integre
d. Nessuna delle precedenti

27) **Il profilo professionale, come definito dal DM 740/1994, prevede che l'ostetrica/o possa agire:**

a. Solo in autonomia assoluta
b. Solo in autonomia relativa
c. Solo subordinata al medico ginecologo
d. In autonomia relativa o assoluta a seconda del campo di azione

28) **Per poter interpretare correttamente una registrazione cardiotocografica è indicata una durata minima di**

a. 10 minuti
b. 20 minuti
c. 40 minuti
d. 60 minuti

29) **Secondo l'OMS, la fase attiva del primo stadio di travaglio generalmente non supera, per le nullipare, le:**

a. 12 ore
b. 10 ore
c. 8 ore
d. 6 ore

30) **La donna in gravidanza deve essere sensibilizzata a prestare particolare attenzione a quale indicatore di benessere fetale?**

a. Movimenti attivi fetali
b. Battito cardiaco fetale
c. Algie pelviche
d. Aumento ponderale

PROVA NON ESTRATTA 10/09/2025

PROVA PRATICA 1

In relazione all'immagine a lato indicare:

1- Il nome dello strumento utilizzato.....
2- L'utilizzo di questo ausilio (CROCETTARE LA RISPOSTA CORRETTA):

Rilassa la muscolatura pelvica e i legamenti	☐ VERO	☐ FALSO
Allunga la durata del travaglio	☐ VERO	☐ FALSO
Consente al feto di completare più liberamente la rotazione	☐ VERO	☐ FALSO

3 – Indica la presentazione fetale raffigurata nell'immagine



.....

4- Manovre di Leopold: indicare a quale numero di manovra fa riferimento l'immagine



.....

5- Manovre di Leopold: in riferimento all'immagine indicarne lo scopo di utilizzo

.....

6- In caso di MPP (minaccia parto prematuro) indicare la corretta cronologia e somministrazione dello schema terapeutico di ATOSIBAN

a. Bolo 0,9 ml IM
b. 2 fiale da 5 mg diluite in 500 ml di soluzione fisiologica da infondere a 120 ml/ora
c. Bolo da 0,9 ml EV
d. Dopo 3 ore da inizio infusione, riduzione della velocità a 40 ml/ora
e. Dopo la dose di attacco attesa di 2 ore prima di proseguire con lo schema

I) c, e, b
II) c, b, d
III) a, b, d

7- La garza 10x10 cm rappresentata nell'immagine a lato, identifica una perdita ematica di circa:

a. 5 ml
b. 20 ml
c. 100 ml

8- Elenca almeno tre delle quattro T da valutare nella gestione della emorragia post partum primaria:

....

PROVA ESTRATTA 10/04/2025

PROVA PRATICA 2

In relazione all'immagine a lato indicare:

1- Il nome dello strumento utilizzato.....
2- L'utilizzo di questo ausilio (CROCETTARE LA RISPOSTA CORRETTA):

Riduce la durata del travaglio	☐ VERO	☐ FALSO
Diminuisce i diametri del bacino	☐ VERO	☐ FALSO
Migliora la circolazione fetale	☐ VERO	☐ FALSO

3 – Indica la presentazione fetale raffigurata nell'immagine



.....

4- Manovre di Leopold: indicare a quale numero di manovra fa riferimento l'immagine

.....

5- Manovre di Leopold: in riferimento all'immagine indicarne lo scopo di utilizzo

.....

6- Indica tra quelli elencati, i farmaci impiegati nella preeclampsia:

a. Nifedipina
b. Sulprostone
c. Metildopa
d. Labetalolo
e. Metilergometrina

I) a, c, d
II) a, b, d
III) c, d, e

7- La traversa assorbente di cm 60x90, rappresentata nell'immagine a lato, identifica una perdita ematica di circa:

a. 500 ml
b. 200 ml
c. 1000 ml

8- Elenca almeno tre delle quattro T da valutare nella gestione della emorragia post partum primaria:

....

PROVA NON ESTRATTA 10/04/2025

PROVA PRATICA 3

In relazione all'immagine a lato indicare:

1- Il nome dello strumento utilizzato……
2- L'utilizzo di questo ausilio (CROCETTARE LA RISPOSTA CORRETTA):

Riduce la durata del travaglio	☐ VERO	☐ FALSO
Diminuisce i diametri del bacino	☐ VERO	☐ FALSO
Migliora la circolazione fetale	☐ VERO	☐ FALSO

3 – Indica la presentazione fetale raffigurata nell'immagine



……

4- Manovre di Leopold: indicare a quale numero di manovra fa riferimento l'immagine

……

5- Manovre di Leopold: in riferimento all'immagine indicarne lo scopo di utilizzo

……

6- In caso di MPP (minaccia parto prematuro) indicare la corretta cronologia e somministrazione dello schema terapeutico di ATOSIBAN

a. bolo 0,9 ml IM
b. 2 fiale da 5 mg diluite in 500 ml di soluzione fisiologica da infondere a 120 ml/ora
c. Bolo da 0,9 ml EV
d. Dopo 3 ore da inizio infusione, riduzione della velocità a 40 ml/ora
e. Dopo la dose di attacco attesa di 2 ore prima di proseguire con lo schema

I) c, e, b
II) c, b, d
III) a, b, d

7- L'arcella di misura media rappresentata nell'immagine a lato, identifica una perdita ematica di circa:



a. 500 ml
b. 200 ml
c. 1000 ml

8- Elenca almeno tre delle quattro T da valutare nella gestione della emorragia post partum primaria:

…… …… …… ……

PROVA NON ESTRATTA
14/4/2025
Gosco Mododolore

14/04/2025
PROVA ORALE DEL MATTINO

PROVA N. 1

Come si effettua la valutazione di un allattamento efficace

PROVA NON ESTRATTA
14/4/2025
Gosco Mododolore

PROVA N. 1

A midwife is a health professional who cares for mothers and newborns around childbirth, a specialisation known as midwifery. The education and training for a midwife concentrates extensively on the care of women throughout their lifespan; concentrating on being experts in what is normal and identifying conditions that need further evaluation.

PROVA NON ESTRATTA
14/04/2023
Gosco Mododolore

PROVA N. 1

Cosa significa effettuare un DOWNLOAD?

PROVA NON ESTRATTA
14/04/2025
Gosco Maddalena

PROVA ORALE DEL MATTINO.

PROVA N. 2

Utilizzo appropriato della cardiotocografia durante il travaglio

PROVA NON ESTRATTA
14/4/2025
Gosco Maddalena

PROVA N. 2

In most countries, midwives are recognised as skilled healthcare providers. Midwives are trained to recognise variations from the normal progress of labour and understand how to deal with deviations from normal. They may intervene in high risk situations such as breech births, twin births, using non-invasive techniques.

PROVA NON ESTRATTA
14/4/2025
Gosco Maddalena

PROVA N. 2

A che cosa serve comprimere o zippare un file?

PROVA ESTRATTA
14/4/2025
Gosco Maddalena

PROVA ORALE DEL MATTINO

PROVA N. 3

Malposizione fetale: gestione ostetrica

PROVA ESTRATTA
14/4/2025
Gosco Maddalena

PROVA N. 3

Descrivere le funzioni di TAGLIA/COPIA/INCOLLA in Ms Word

PROVA ESTRATTA
14/4/2025
Gosco Maddalena

PROVA N. 3

The midwife is recognized as a responsible and accountable professional who works in partnership with women to give necessary support during pregnancy, labor, and the postpartum period. The midwife has an important task in health counselling and education, not only for the woman, but also within the family and the community.

PROVA ORALE DEL POMERIGGIO
PROVA NON ESTRATTA 14/04/25 Viola Bentanti

PROVA N. 1

Fase di transizione in travaglio: ruolo dell'ostetrica

PROVA NON ESTRATTA 14/04/25 Viola Bentanti

PROVA N. 1

A midwife provides care for the newborn and the infant up to a month after birth; this care includes preventative measures, the promotion of normal birth, the detection of complications in mother and child, the accessing of medical care or other appropriate assistance, and the carrying out of emergency measures.

PROVA NON ESTRATTA 14/04/25 Viola Bentanti

PROVA N. 1

Cosa si intende con la parola BACKUP ?

PROVA ORALE DEL CONCORSO
PROVA NON ESTRATTA 14/04/25 Viola Barbati

PROVA N. 2

Bilancio di salute in gravidanza: ruolo dell'ostetrica

PROVA NON ESTRATTA 14/04/25 Viola Barbati

PROVA N. 2

Poor mental health during and after pregnancy is a key contributor to maternal morbidity and mortality, despite the potential for preventative measures. Increasing physical activity levels during pregnancy has been recognised as a potential non-pharmacological method of improving maternal mental wellbeing, yet it is not routinely discussed by healthcare professionals.

PROVA NON ESTRATTA 14/04/25 Viola Barbati

PROVA N. 2

Cos'è un VIRUS INFORMATICO e quali sono i principali metodi di diffusione?

PROVA ESTRATTA 14/04/25 Ziola Bertanti

PROVA N. 3

Distocia di spalla: segnali e gestione

PROVA ESTRATTA 14/04/25 Ziola Bertanti

PROVA N. 3

The association between mental wellbeing and physical activity in the non-pregnant population has been well established, but remains overlooked in pregnancy. It is crucial that healthcare professionals are aware and understand the positive impact that being physically active during pregnancy has on maternal mental wellbeing.

PROVA ESTRATTA 14/04/25 Ziola Bertanti

PROVA N. 3

COSA SI INTENDE PER POSTA PEC?