

Strutture semplici endoscopia digestiva ASLCN1

مقر المستشفى لشيغا . الهاتف 723610/0174
مقر المستشفى لموندوفي . الهاتف 677071/0174
مقر المستشفى لسالوزو . الهاتف 0175/215257
مقر المستشفى لسفليانو . الهاتف 719280/0172
ambchirurgiaendoscopica.savigliano@aslcn1.it
ambendoscopia.mondovi@aslcn1.it
endoscopia.saluzzo@aslcn1.it
endoscopia.ceva@aslcn1.it

سيدي العزيز / سيدتي العزيزة

لكي يتم إعلامك بطريقة واضحة وكافية بالتدخل الذي تحتاجه، بعد المناقشات التي أجريت سابقاً، يرجى قراءة هذه الوثيقة بعناية. ليس المقصود من المعلومات الواردة فيه أن تسبب لك أي قلق، ولكنها أصبحت الآن إلزامية لتسمح لك أن تقرر بحرية ووضوح وبالتالي بشكل أفضل وأكثر وعياً ما إذا كنت ستنفذ العملية أم لا. ومن المفهوم أنه يمكنك ويجب عليك أن تطلب من الموظفين المسؤولين أي توضيحات وتوضيحات إضافية تحتاجها. أخيراً، يجب عليك إحضار جميع الوثائق السريرية التي بحوزتك (التحاليل أو الفحوصات السريرية، الاختبارات الإشعاعية، إلخ)

هام: أحضر قائمة الأدوية التي تتناولها يومياً

ما هو تنظير القولون وتنظير المستقيم والسيني

هي إجراءات تستخدم لتشخيص أمراض القولون والمستقيم أو لفحص هذه الأعضاء التي قد تتأثر بأمراض أخرى ذات أصل جهازي. يتم إجراؤها عن طريق إدخال المنظار أي مسبار طويل ومرن من خلال فتحة الشرج لفحص الأعضاء المذكورة. تكون الرؤية مباشرة، عن طريق نظام الألياف الضوئية، أو الإلكترونيات. وللسماح برؤية دقيقة للجدران الداخلية، يتم نفخ الأعضاء بالهواء، والذي سيتم إعادة استنشاقه قدر الإمكان قبل نهاية الفحص. تنظير المستقيم والسيني هو فحص فعال يسمح لك برؤية جدران الجزء الأخير من القولون . (السيني والمستقيم) بشكل مباشر

ماذا تفعل قبل الفحص؟

من الضروري الامتناع عن الأطعمة الصلبة منذ بداية تحضير الأمعاء حتى الفحص ومن الضروري أن يكون معك شخص ما . بناءً على طلبك، سيقوم الطبيب أو الممرضون بشرح المزيد من التفاصيل والإجابة على أسئلتك، قبل الفحص، سيتعين عليك إزالة أي نظارات و/أو أشياء معدنية (الساعات والخواتم وما إلى ذلك). سيتم إجباره على الاستلقاء على الطاولة على جانبه الأيسر. من المهم إبلاغ الطبيب بأي حساسية تجاه الأدوية والعلاجات الحالية التي يمكن أن تعدل تخثر الدم (مضادات التخثر، مضادات الصفائح، إلخ.) قبل بدء الفحص، قد يتم إعطاؤك مسكناً و/أو مسكناً للألم عن طريق الوريد لجعلك أكثر استرخاءً وتخفيف الانزعاج من النفخ. سيقوم الطبيب بعد ذلك بإدخال المنظار من خلال فتحة الشرج. بشكل عام، يجب ألا يسبب لك إدخال الأداة وتطورها أي شيء آخر سوى الانزعاج البسيط المرتبط بتضخم القولون؛ في بعض الحالات، بسبب تعرج معين في الأمعاء، قد تشعر بالألم في البطن مشابه لتلك التي قد تسبق التغوط مع الإسهال. يمكن تخفيف هذه الاضطرابات بالتنفس البطيء والعميق. تختلف مدة الفحص تبعاً لخصائص القولون وما إذا كان من الضروري إجراء مناورات جراحية أم لا. أثناء الفحص بالمنظار، قد يكون من الضروري إجراء أي خزعات ومناورات تدخلية (استئصال السلائل، والتوسيع، والحقن المصلية، وإزالة الأجسام الغريبة) وتنفيذ العلاج . بمضادات التشنج ومزيلات القلق ومسكنات الألم، إذا لزم الأمر

المضاعفات

النزيف (0.3-6.1%) حيث يتم عادة حل النزيف الفوري بالمنظار في 2% من المرضى، قد يحدث نزيف متأخر والذي يمكن أن يحدث لمدة تصل إلى 7-30 يوماً بعد الإجراء؛ انتقاب الأحشاء (0.07-0.3% من 0.04-1% أثناء استئصال السليلة) وإذا كان العلاج بالمنظار غير فعال، يستطب التدخل الجراحي؛ المضاعفات

التخدير أو ابتلاع عناصر تتمثل في انخفاض الأكسجين في الدم؛ توقف التنفس. نوبة قلبية. المضاعفات الأخرى النادرة جدًّا هي: انفجار الغازات المعوية؛ تمزق الطحال؛ التهاب الزائدة الدودية الحاد انتفاخ الرئة تحت الجلد وتمزق الأوعية المسارية. ردود الفعل غير المرغوب فيها لاستخدام المخدرات

ماذا يحدث بعد الفحص

بعد الفحص، قد يعاني المريض من تورم مستمر وألم في البطن يهدأ عادةً خلال دقائق قليلة دون الحاجة إلى مناورات أو علاجات إضافية. ومع ذلك، في بعض الحالات، قد يكون من الضروري وضع مسبار مستقيمي لتسهيل التخلص من الهواء المتدفق أثناء الفحص. إذا تم تنفيذ المناورات العلاجية، اعتماداً على حكم الطبيب، فقد تتم الإشارة إلى مراقبة سريرية أطول. إذا تم إجراء الفحص تحت التخدير، فقد يكون هناك في النهاية نعاس مؤقت أو دوخة أو عدم وضوح الرؤية أو ازدواج الرؤية. على أية حال، لا يمكن إخراج المريض من المستشفى إلا إذا كان مصحوباً، وبالتالي لا يمكنه قيادة السيارات أو المركبات أو القيام بمناورات أو مناورات محفوفة بالمخاطر تتطلب اهتماماً خاصاً خلال الـ 24 ساعة التالية للإجراء. يتم الاتفاق على استئناف العلاجات المستمرة والتغذية وتناول السوائل مع أخصائي الرعاية الصحية في وقت الخروج. إذا لم يتم إجراء أي تخدير، فسيتمكن المريض من العودة إلى المنزل أو إلى الجناح، حتى بمفرده. بعد بضع ساعات، قد تظهر علامات المضاعفات المتأخرة المتعلقة بالفحص. لذلك من المهم التعرف على العلامات المبكرة للمضاعفات المحتملة. الأعراض المنبهة هي: ألم مع توتر في البطن، تعرق مع انخفاض ضغط الدم، بداية حمى ونزيف مع انبعاث دم أحمر فاتح أو داكن، حركات الأمعاء مغلقة أمام البراز والغازات. في هذه الحالة يُنصح بالذهاب إلى غرفة الطوارئ، ربما في نفس المنشأة التي تم فيها إجراء الإجراء. بعد إجراء الفحص بالمنظار، سيتم استبعاد المريض مؤقتاً، لمدة 12 شهراً، من أي تبرع بالدم

ما يجب فعله في حالة عدم اكتمال الفحص (30/5% من الحالات) :
في حالة عدم اكتمال الفحص، حسب السبب، سيشير الطبيب إلى الإجراءات التي سيتم تنفيذها

ما هي بدائل تنظير القولون/تنظير السيني المستقيمي؟

تعد حقنة الباريوم الشرجية وتنظير القولون الافتراضي حالياً من التقنيات البديلة لتنظير القولون. وهما تقنيات إشعاعية. لا يسمح أي منها بإجراء خزعات للفحص النسيجي وتنفيذ المناورات الجراحية (استئصال السلائل، وما إلى ذلك). كما هو الحال مع تنظير القولون، تتطلب هذه الإجراءات البديلة أيضاً تحضير الأمعاء. يجب تقييم أي إشارة لهذه الإجراءات البديلة مع طبيبك مع الأخذ في الاعتبار المخاطر والفوائد

SS Risk Management
SS Medicina Specialistica Ambulatoriale e Privato Accreditato per diffusione ai Medici e agli infermieri dei Poliambulatori
SS Direzione Amministrativa Distrettuale per diffusione ai MMG e PLS
SC DISTRETTO SUD-OVEST
SC DISTRETTO SUD-EST
SC DISTRETTO NORD-OVEST
SC DISTRETTO NORD-EST
SC MEDICINA INTERNA MONDOVI'
SC MEDICINA INTERNA SALUZZO
SC MEDICINA INTERNA CEVA
SC MEDICINA INTERNA SAVIGLIANO
SC LUNGODEGENZA FOSSANO
Ssd Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria
SC CARDIOLOGIA MONDOVI'
SC CARDIOLOGIA SAVIGLIANO
SC NEUROLOGIA MONDOVI'
SC NEUROLOGIA SAVIGLIANO
SC CHIRURGIA GENERALE SAVIGLIANO
SC CHIRURGIA GENERALE MONDOVI'
SC UROLOGIA SAVIGLIANO
SC OCULISTICA SAVIGLIANO
SC OTORINOLARINGOIATRIA SAVIGLIANO
SC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA MONDOVI'
SC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SAVIGLIANO
SSD Fisiopatologia Respiratoria
SC ANESTESIA E RIANIMAZIONE SAVIGLIANO
SC ANESTESIA E RIANIMAZIONE MONDOVI'
SC PEDIATRIA SAVIGLIANO
SC PEDIATRIA MONDOVI'
SC GINECOLOGIA E OSTETRICIA SAVIGLIANO
SC GINECOLOGIA E OSTETRICIA MONDOVI'
SC PSICHIATRIA AREA SUD
SC PSICHIATRIA AREA NORD
SC Logistica e DAPO per diffusione alla Ss Gestione Front Office
SC ONCOLOGIA SALUZZO

E per conoscenza:

SC DIREZIONE SANITARIA SAVIGLIANO
SC DIREZIONE SANITARIA MONDOVI'

Deve rimanere evidenza della diffusione secondo le modalità presenti in Azienda.

Stesura per il gruppo di lavoro			Verifica/Approvazione	Emissione
Qualifica	Nome Cognome	Firma		
Dirigente medico	Corrado Genovesi		Per l'U.G.R. Il Responsabile SS Risk Management	Firma del D SC/Diparti
Dirigente medico	Paolo Viazzi		Maurizio Salvatico	Toni Paz
			_____	_____