

Strutture semplici endoscopia digestiva ASLCN1

الهاتف 723610/0174

المستشفى التابع لشيفا مقر

endoscopia.ceva@aslcn1.it

الهاتف 677071/0174 .

مقر المستشفى التابع لموندوفي

ambendoscopia.mondovi@aslcn1.it

الهاتف 215257/0175 .

مقر المستشفى التابع لسالوزو

endoscopia.saluzzo@aslcn1.it

الهاتف 0172/719280 Tel. مقر المستشفى التابع لموندوفي

ambchirurgiaendoscopica.savigliano@aslcn1.it

سيدتي العزيزة / سيدي العزيز

لكي يتم إعلامك بطريقة واضحة وكافية بالتدخل الذي تحتاجه، بعد المناقشات التي أجريت سابقاً، يرجى قراءة هذه الوثيقة بعناية. ليس المقصود من المعلومات الواردة فيه أن تسبب لك أي قلق، ولكنها أصبحت الآن إلزامية لتسمح لك أن تقرر بحرية ووضوح وبالتالي بشكل أفضل وأكثر وعياً ما إذا كنت ستنفذ العملية أم لا. ومن المفهوم أنه يمكنك ويجب عليك أن تطلب من الموظفين المسؤولين أي توضيحات وتوضيحات إضافية تحتاجها. أخيراً، يجب عليك إحضار جميع الوثائق السريرية التي بحوزتك (التحاليل أو الفحوصات السريرية، الاختبارات الإشعاعية، إلخ)

هام: أحضر قائمة الأدوية التي تتناولها يومياً

ما هو تنظيف المريء - المعدة - الاثني عشر؟

تنظيف المريء والمعدة والاثني عشر (تنظيف المعدة) هو أسلوب يمكن لطبيبك من خلاله فحص المريء والمعدة والاثني عشر لمعرفة ما إذا كان هناك أي أفة تسبب مشاكلك. كما يتيح لك الحصول على عينات الأنسجة لفحصها بطريقة بسيطة وغير مؤلمة. المنظار عبارة عن مسبار مرن يبلغ قطره 8-9 ملم مع ضوء واضح في نهايته والذي سيتم تمريره عبر فمك إلى معدتك والاثني عشر

ماذا تفعل قبل الاختبار؟

يجب عليك الصيام لمدة ست ساعات على الأقل قبل إجراء الاختبار ومن الأفضل أن تكون بصحبة شخص ما. أحضر معك تحويلة الطبيب والفحوصات الإشعاعية وتقارير مناظير المعدة السابقة. من المهم إبلاغ طبيبك بأي حساسية تجاه الأدوية والعلاجات الحالية التي يمكن أن تعدل تخثر الدم (مضادات التخثر، مضادات الصفائح، إلخ). بناء على طلبك، سيقوم الطبيب أو الممرضات بشرح المزيد من التفاصيل والإجابة على أسئلتك: سوف تجلس على سرير المخصص لذلك و سيتعين عليك بعد ذلك إزالة أي أطقم أسنان قابلة للإزالة من فمك. تنظيف المعدة ليس مؤلم ولكن قد يجده بعض الناس غير مريح. لتحسين الالتزام بالفحص، إذا لزم الأمر، سيتم إعطاؤك مسكناً و/أو مسكناً للألم عن طريق الوريد. سيتم إعطاؤك رذاذاً مخدرًا موضعياً في فمك لتقليل فرصة التقيؤ. بعد التخدير، سيتم جعلك تستلقي على جانبك الأيسر وسيبدأ الفحص. سيتعين عليك فتح فمك، وسيتم وضع قطعة فموية بين أسنانك لتجنب أي عض للأداة وصدمة للأسنان، ثم سيتم وضع طرف منظار المعدة على اللسان وستتم دعوتك إلى البلع حتى تتمكن من البلع. سوف يمر المنظار إلى المريء وبعد ذلك لن يكون عليك سوى التنفس بعمق باستخدام أنفك وترك اللعاب يسيل على قطعة القماش المناسبة. سوف يستمر الاختبار بضع دقائق ثم سيتم إزالة الأداة بسرعة. أثناء الفحص بالمنظار، قد يكون من الضروري إجراء أي خزعات ومناورات تدخلية (استئصال السلائل، والتوسيع، والحقن المصلب، وإزالة الأجسام الغريبة)، وإذا لزم الأمر، إجراء العلاج بمضادات التشنج، ومزيلات القلق ومسكنات الألم.

المضاعفات

الأم الأسنان وزراعة الأطراف الاصطناعية. النزف (0.3-6.1%) حيث يتم عادة حل النزيف الفوري بالمنظار؛ في 2% من المرضى، قد يحدث نزيف متأخر والذي يمكن أن يحدث لمدة تصل إلى 7-30 يوماً بعد الإجراء؛ انتقاب الأحشاء (0.07-0.3%) من 0.04-1% أثناء استئصال السليلة) وإذا كان العلاج بالمنظار غير فعال، يستطب التدخل الجراحي؛ المضاعفات القلبية التنفسية والدورة الدموية التي ترتبط عادة بالتخدير و/أو ابتلاع النفايات تتمثل في انخفاض الأكسجين في الدم؛ توقف التنفس. نوبة قلبية

ماذا يحدث بعد الاختبار

سيتم تسليم تقرير التنظير إليك فورًا، بينما سيتعين عليك الانتظار بضعة أيام للحصول على نتائج أي خزعات. إذا شعرت خلال الساعات التالية للفحص بألم في البطن أو لاحظت خروج براز أسود، فاتصل بخدمة تنظير الجهاز الهضمي أو قسم الطوارئ على الفور. إذا تم إجراء الفحص تحت التخدير، فقد يكون هناك في النهاية نعاس مؤقت، أو دوخة أو عدم وضوح الرؤية، أو ازدواج الرؤية على أية حال، لا يمكن إخراج المريض من المستشفى إلا إذا كان مصحوبًا، وبالتالي لا يمكنه قيادة السيارة أو المركبات أو القيام بمناورات أو مناورات محفوفة بالمخاطر تتطلب اهتمامًا خاصًا خلال الـ 24 ساعة التالية للإجراء. يتم الاتفاق على استئناف العلاجات المستمرة والتغذية وتناول السوائل مع أخصائي الرعاية الصحية في وقت الخروج. إذا لم يتم إجراء أي تخدير، فسيتمكن المريض من العودة إلى الجناح أو المنزل بمفرده.

ما هي بدائل تنظير المريء والمعدة والاثني عشر؟

يتم تمثيلهم عن طريق التصوير الشعاعي باستخدام وسيلة التباين والتصوير المقطعي المحوسب ذلك ولديها دقة تشخيصية أقل ولا تسمح بإجراء الخزعات، ولا الإجراءات الجراحية ومع ذلك، غالبًا ما تحتاج إلى دمجها مع التنظير اللاحق. يتمثل البديل عن الإجراءات التداخلية في الغالب في الجراحة التي تنطوي على مخاطر أكبر. يمثل تنظير المعدة الاختبار المفضل لتشخيص الآفات العضوية، مثل القرحة والأورام، بدقة تزيد عن 95% ويسمح للطبيب بتحديد سبب ظهور العديد من الأعراض التي تعزى إلى أمراض الجهاز الهضمي العلوي.