

消化道内窥镜检查的地点ASLCN1

Ceva医院	Tel. 0174/723610	endoscopia.ceva@aslc1.it
Mondovì医院	Tel. 0174/677071	ambendoscopia.mondovi@aslc1.it
Saluzzo医院	Tel. 0175/215257	endoscopia.saluzzo@aslc1.it
Savigliano医院	Tel. 0172/719280	ambchirurgiaendoscopica.savigliano@aslc1.it

Xxx先生/女士,

根据以前的讨论且为了让您更加知悉您需要进行的检查, 请您仔细阅读该文件。该文件的目的是让您更自觉地决定是否进行检查, 而不是想要让您担心。如需了解进一步相关信息, 您当然可以且必须向责任人员咨询。最后, 您必须将所有的医疗报告(医疗分析或调查、放射检查报告、等等)带过来。

注意: 将每天服用的药物单子带过来

食道胃十二指肠镜检查是什么?

食道胃十二指肠镜检查是一项医生可以检查食道、胃及十二指肠的技术, 来检查是否有任何伤病引起您的不适。通过这项检查也可以以简单和无痛的方式采集小组织样本来进行检查。内窥镜是一根直径为8-9毫米及末端带有清晰的光线的柔性探头, 该探头将通过您的口腔进入您的胃和十二指肠。

检查之前必须做什么?

检查开始前6小时内不要进食, 并建议有人陪您一起来。请将医生已给您的检验单、放射检查报告和之前进行的胃镜检查报告都带来。如果您有药物过敏或您正在服用可能会影响血液凝结的药物(如抗凝血药、抗血小板药物等等)必须告知医生。您有任何问题, 医生和护士会给您解答, 并

提供更多的细节解释。您需要卧在病床上躺下。接下来，您必须从嘴里取出所有可摘假牙。胃镜检查并不感到疼痛，但有些人可能会觉得不舒服。为了提高检查结果的准确性，您可能被在静脉上注射安神药或止痛药。您口腔内会注射局部麻醉，来减少干呕的可能性。术前用药后，您需要左侧卧在病床上躺下，然后检查会开始。您必须张开嘴，然后医生会在您的牙齿之间放置一个口垫，用来避免您咬到胃镜及牙齿受到外伤。接下来，胃镜的尖端会放在您舌头上，您将被邀请吞咽，以便使内窥镜进入食道，然后您只需通过鼻子深呼吸，让口水自然流出。检查只需几分钟的时间，结束后内窥镜会快速拉出来。检查进行中可能会需要进行活检或其他小手术（如息肉切除术、扩张术、硬化注射、异物取出），并若需要进行解痉药、抗焦虑药和止痛药的治疗。

并发症

牙齿和假牙外伤；出血（0.3-6.1%）：立即出血通常可以通过内窥镜解决，2%的患者可能会出现检查后7到30天的晚期出血；肠穿孔（0.07-0.3%，从0.04-1%息肉切除术进行中），如果内窥镜治疗无效可能会需要进行手术；心肺和循环系统并发症，该并发症通常与术前用药和摄入反酸物有关，由血液中氧气下降表示；呼吸衰竭；心脏病发作。

检查后发生什么

您立刻会收到内窥镜检查的报告，活检的报告需要几天的时间才能收到。如果检查后的几个小时内，您感到腹痛或您注意到排便时出现黑色粪便，请立即联系消化道内窥镜服务（Servizio di Endoscopia Digestiva）或急诊室。如果检查是在安神药状态下进行的，检查结束后可能会暂时残留睡意、头晕、昏花或复视。无论如何，您只有在有人陪伴的情况下才可以出院，而且检查后24个小时内您不可以开车、骑车、进行危险操作或需

要特别注意的操作。出院时，医生会告知您是否可以开始恢复之前的持续治疗、对营养和饮品的摄入。如果没有注射安神药，您可以自己一个人回家或病房。

食道胃十二指肠镜检查的替代方法有哪些

造影剂X线检查和CT检查是食道胃十二指肠镜检查的替代技术，可是它们的诊断准确率较低，因此不允许医生进行活检和进行小手术，所以通常需要与后续的内窥镜检查结合。其他替代方法是手术，可是风险更大。胃镜检查是诊断器质性病理的理想检查（如溃疡和肿瘤），准确率超过95%，并让医生检查出与上消化道病变相关的许多症状的出现。